

Algunas cosas que un bebé con audición normal debe poder hacer:

### **Nacimiento a 3 Meses de Edad**

- Parpadear o saltar cuando hay un ruido fuerte y repentino
- Tranquilizarse o sonreír cuando se le habla
- Hacer sonidos como “ohh”, “ahh”

### **6 a 9 Meses de Edad**

- Girar la cabeza hacia sonidos fuertes
- Comprender “no-no” o “adiós- adiós”
- Balbucear, por ejemplo “baba,” “mama,” “gaga”

### **9 a 12 Meses de Edad**

- Repetir palabras simples y sonidos que usted hace
- Usar correctamente “mamá” o “papá”
- Responder a música o canto
- Señalar sus juguetes u objetos favoritos cuando se le pregunta

*Si tiene preguntas sobre la audición de su bebé o sobre esta lista, hable con el profesional de salud de su bebé.*

**¿Dónde puedo obtener más información?**

Visite [www.babyhearing.org](http://www.babyhearing.org)

Departamento de Salud y  
Ambiente de Kansas

SoundBeginnings

Programa de Intervención y  
Detección Temprana de  
Audición

1000 SW Jackson Street Suite 220  
Topeka, KS 66612  
Teléfono: 800-332-6262



***Los bebés con riesgo  
de pérdida auditiva  
necesitan pruebas  
adicionales de audición***

*Detectar de forma temprana la  
pérdida auditiva puede hacer  
una gran diferencia en la  
vida de su bebé.*



## Su bebé necesita otra prueba de audición

### Mi bebé pasó la revisión auditiva. ¿Por qué necesita otra prueba de audición?

Su bebé tiene uno o más factores de riesgo que pueden incrementar su posibilidad de desarrollar una pérdida auditiva a medida que crece. Estos factores de riesgo incluyen:

- Antecedentes familiares de pérdida auditiva permanente. Esto significa padres o hermanos que han tenido pérdida auditiva desde la infancia
- Cuidados intensivos en sala NICU por más de 5 días
- Respiración asistida por más de 5 días
- Exposición a medicamentos ototóxicos (Gentamicyn, Tobramycin), diuréticos de aro (Furosemide/Lasix)
- Hiperbilirrubinemia que requiere transfusión de intercambio
- Exposición a infecciones al nacer (CMV, herpes, rubeola, sífilis, meningitis bacteriana y viral, toxoplasmosis)
- Peso al nacer menor de 1500 gramos
- Problemas estructurales de la cara o cabeza
- Síndromes asociados con pérdida auditiva o pérdida auditiva progresiva o tardía (Usher, Waardenburg, Alport, Pendred, Jervell y Lange-Nielson, Hunter, ataxia de Friedreich, Charcot-Marie-Tooth, etc.)

Aunque solo un pequeño número de bebés con estos factores de riesgo desarrollarán realmente una pérdida auditiva, resulta importante que su bebé tenga pruebas de audición con un Audiólogo cuando esté un poco más grande.

### ¿Qué es un Audiólogo y cuándo se recomiendan pruebas de audición de seguimiento para mi bebé?

Un audiólogo es un especialista de audición que tiene los conocimientos y el equipo para realizar pruebas detalladas de audición (pruebas de diagnóstico auditivo).

El audiólogo examinará la audición de su bebé entre los 6 y 12 meses de edad, dependiendo de las necesidades específicas de su bebé.

**Si le preocupa la audición de su bebé antes de la cita, puede contactar al médico de su bebé o a un audiólogo.**



**Es común que un bebé necesite más de una cita antes de tener disponibles los resultados completos.**

### ¿Qué sucede si mi bebé tiene una pérdida auditiva?

Si su bebé tiene una **pérdida auditiva temporal** su audiólogo deseará ver a su bebé otra vez para confirmar que la pérdida auditiva temporal ha desaparecido. Si no desaparece, su audiólogo recomendará que su bebé vea a un especialista en Oído Nariz y Garganta (ENT) - Otorrinolaringólogo.

Si su bebé tiene una **pérdida auditiva permanente** su audiólogo le hablará sobre los diferentes procesos y opciones disponibles, además de vincularlo con un programa de intervención temprana en su área. Ellos podrán ayudarle a conectarse con una gama de diferentes servicios importantes para las necesidades específicas de su hijo.

### Mi bebé parece estar respondiendo a los sonidos. ¿Aun así necesita otra prueba de audición?

La mayoría de los bebés con pérdida auditiva escucharán y responderán a algunos sonidos. Por lo tanto, detectar la pérdida auditiva es imposible sin utilizar el equipo de prueba adecuado.

**Descubrir que su bebé tiene una pérdida auditiva a una edad temprana, proporciona la mejor oportunidad de asistirlo en el desarrollo del habla y el lenguaje. Esto es importante para el aprendizaje futuro y el bienestar social y emocional de su hijo.**